

BIOPSIAS O DRENAJES DIRIGIDOS POR ECOGRAFÍA O TOMOGRAFÍA – NEFROSTOMÍA

ASIGNACIÓN DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar.
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Autorización para el estudio de las muestras producto de la biopsia (patología).
4. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
5. Si toma anticoagulantes como Warfarina, heparina o Ácido Acetil Salicílico informar al personal de citas. En caso de requerir suspensión de dichos medicamentos solicitar autorización del médico tratante.
6. Informar al personal de citas sobre historia de alergias a medicamentos, alimentos, y/o medios de contraste; así como también reportar si está embarazada o tiene sospecha.
7. Si además de la biopsia el paciente requiere una tomografía con medio de contraste, debe informar el resultado de la creatinina vigente no superior a un mes.
8. En los últimos ocho (8) días no debe haber tenido estudios con medio de contraste baritado.
9. Traer los resultados de TPT, TP y recuento de plaquetas (con una vigencia no mayor a un mes), para ser evaluados por el radiólogo y poder programarlo para el examen.

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN:

Aproximadamente tres horas.

DÍA DEL EXAMEN:

1. Ayuno mínimo de 4 horas.
2. Presentarse 1 hora antes del examen para la preparación.
3. Traer los resultados de los exámenes de laboratorio TP-TPT- Recuento de plaquetas, no superiores a 30 días.
En caso de requerir tomografía, traer el resultado de la creatinina no superior a un mes y dentro del valor de referencia.
4. Traer los estudios radiológicos relacionados con el examen a realizar.
5. Si toma medicamentos de control para la Hipertensión arterial y/o Diabetes, ingerirlos con poca agua. NO SUSPENDER.
6. Asistir con un acompañante ADULTO Y RESPONSABLE.
7. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. Cedimed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

BIOPSIAS O DRENAJES DIRIGIDOS POR ECOGRAFÍA O TOMOGRAFÍA – NEFROSTOMÍA

CUIDADOS POSTERIORES:

1. Debe desplazarse a su casa en vehículo particular o taxi.
2. Guardar reposo por 24 horas.
3. No realizar esfuerzos durante el día del examen y posterior a éste.
4. Puede continuar con su dieta y medicación acostumbrada, a menos que el médico que le realice el procedimiento le dé una orden especial.
5. Si aparece hematoma (acumulo de sangre en el sitio de la punción), comunicarse de inmediato con el médico tratante o consultar por urgencias.
6. Si está sangrando, realice presión en el sitio de punción; si no mejora, consultar de inmediato al centro asistencial más cercano o urgencias.
7. En caso de dolor en el sitio de punción, puede tomar analgésico tipo acetaminofén, no derivados del ácido acetil salicílico – ASA (aspirina).
8. Acostarse sobre el lado de la punción para hacer presión y evitar sangrado.